

染,初期为红色小丘疹,继而增大
成脓,脓液呈黄色,有臭味。本
病传染性不强,但接触患者
分泌物,特别是眼分泌物,可
引起眼炎。本病常发生于夏
秋季,多见于儿童。本病由
于病原体不同,临床表现有
所差异,如:①单纯疱疹:常
发生于皮肤,初起为红色小
丘疹,继而增大成脓,脓液
呈黄色,有臭味。②单纯
疱疹:常发生于皮肤,初起
为红色小丘疹,继而增大
成脓,脓液呈黄色,有臭味。
③单纯疱疹:常发生于皮肤,
初起为红色小丘疹,继而
增大成脓,脓液呈黄色,有
臭味。④单纯疱疹:常发生
于皮肤,初起为红色小丘
疹,继而增大成脓,脓液呈
黄色,有臭味。⑤单纯疱
疹:常发生于皮肤,初起为
红色小丘疹,继而增大成
脓,脓液呈黄色,有臭味。
⑥单纯疱疹:常发生于皮肤,
初起为红色小丘疹,继而
增大成脓,脓液呈黄色,有
臭味。⑦单纯疱疹:常发生
于皮肤,初起为红色小丘
疹,继而增大成脓,脓液呈
黄色,有臭味。⑧单纯疱
疹:常发生于皮肤,初起为
红色小丘疹,继而增大成
脓,脓液呈黄色,有臭味。
⑨单纯疱疹:常发生于皮肤,
初起为红色小丘疹,继而
增大成脓,脓液呈黄色,有
臭味。⑩单纯疱疹:常发生
于皮肤,初起为红色小丘
疹,继而增大成脓,脓液呈
黄色,有臭味。