

高血压:从此不再年年治!

许多西医讲高血压需终生服药,患者也把这个说法当作“真理”,因此长期吃些便宜西药对付。可服了多少年还是头晕头痛,胸闷气短,耳鸣目眩。有的还引发了冠心病中风……

中医药大学研创的【山楂降压丸】(国药准字Z20083328),没想到才1疗程症状就消失了,连服3疗程几十年的高血压不知不觉全好了。

近期专家回访的退休干部苏大爷无限感慨:几年前俺就看到【山楂降压丸】的宣传,当时俺根本不相信高血压能治好,又怕花冤

枉钱,所以还是吃西药,直到去年底开肾伤得厉害,头也昏,胸也闷,老伴“骂”俺太固执,她说“你吃了上十年西药,高血压没治好,还把肝肾吃坏了,【山楂降压丸】到底管不管事,你试一下不就清楚了!”在老伴的“逼迫”下,俺跟高血压专家打了个电话,我觉得她觉得在理,“中医和西医是两种不同的医疗

体系,中医对许多慢性病具有独特的优势,不能说西医治不好的病中医也治不好,高血压患者血管壁脆弱,西药利尿扩管必然加重血管负担,出现中风猝死的可能性大大增加,正确方法应该是柔软血管,恢复血管收缩舒张功能,这样才能根治高血压,【山楂降压丸】首次采用天然血管柔韧剂

金丝桃苷,从柔软血管入手,达到根治高血压的目的。”俺抱着试试的心情用了3疗程,没想到还真管事,几十年的老毛病不知不觉全好了,可得劲了。

★地址:济南医药大厦(甸柳庄)共青团路66号宏济堂、德州2822688,聊城五星百货颐生堂、菏泽曹州、济宁仁安、泰安神农、

新泰润康、莱芜万泽、枣庄金星、滕州同仁、淄博恒川、潍坊华芝堂、东营黄河口、滨州康乐、临沂华康、日照润生堂六店、石臼润生堂、烟台永康堂、威海益春堂

★拨打专家热线:400-688-3367享受买五赠一优惠

★康复中心:济南医药大楼二楼(经二纬三)0531-86272240

今晚专家热线预告

咨询时间:今晚18:30-19:30

内分泌热线

咨询内容:糖尿病、甲状腺疾病、垂体及肾上腺等疾病的诊断

值班专家:山东大学第二医院内分泌科副主任医师 陈诗鸿
咨询电话:0531-85196381

神经内科热线

咨询内容:癫痫、睡眠障碍、脑血管病及偏头痛等神经科疾病

值班专家:山东省千佛山医院神经内科主任医师 唐吉友
咨询电话:0531-85196052

皮肤奇痒 祖传奇方一抹断痒

俗话说:疼不死人痒死人。老中医张启山,祖传断痒脱毒膏“循经脱毒”,膏中成分循经络把分散潜藏于体内深层的毒素一网打尽。膏到痒除,还会从皮肤里冒出丝丝凉气(祛风邪),或渗出珠状液体(祛湿邪),或皮肤微微发红(祛燥火邪),或出现异味黏稠状物(杀虫虫),

多年的手足癣、体癣、头癣、湿疹、丘疹、荨麻疹、疥疮、带状疱疹等皮肤病也因此痊愈。色素沉着及粗糙肥厚的皮肤恢复光鲜亮泽,再顽固的皮肤瘙痒也不再复发。

因断痒脱毒膏配方奇特,且无激素无副作用,老人孩子都能用。凡皮肤奇痒,久治不愈者均可拨打专家热线

0531-55508627详询。(断痒无效退款)
地址:舜天大药房(大观园东门斜对面)参茸(共青团路66号)章丘永兴堂(中医院南)济阳开元德州2598609 淄博8114837 菏泽5086706 滨州3278999 聊城8997960 潍坊2109081 济宁2193033 临沂8906673 枣庄6161932 泰安8171922

●热线辑录

问:女,27岁,已婚未孕,查出垂体微腺瘤,验血发现泌乳素高,如何治疗?

山东省立医院神经外科垂体瘤专家徐广明答:垂体微腺瘤多数是指大小小于1cm的垂体瘤,这类肿瘤由于较小,一般不会引起视力下降、垂体功能下降等压迫症状,多表现为内分泌症状,女性患者多表现为停经泌乳不孕等,治疗则需要遵循国际国内的治疗规范,但也不需要制定个体化方案。

已婚未孕以及化验提示您有高泌乳素血症,但是还需要做其他激素检查,包括生长激素、促肾上腺皮质激素、甲状腺激素系列等,综合评估后再决定治疗方案;如果仅仅是泌乳素高,可以考虑药物治疗或者手术治疗:1.药物(溴隐亭)治疗可以作为泌乳素腺瘤的首选,大多数泌乳素腺瘤对溴隐亭敏感,可以控制肿瘤生长,许多病人在可以服用溴隐亭过程中怀孕。该药临床证明比较安全,不影响怀孕,对胎儿无致畸等副作用,服用的基本原则是找到一个最小有效维持量,就是能使泌乳素降至正常的最小剂量。缺点是药物治疗需要长期服药。2.手术治疗:垂体微腺瘤的手术治疗目前为微创显微手术,手术技术比较成熟,创伤较小,多数病人可以术后五六天即可出院,休息一段时间就可以上班,恢复正常生活。对于药物治疗不敏感、不愿意长期服药、合并其他激素异常的病人,可以首选手术治疗。缺点的手术治疗有一定的风险。

问:得了“灰趾甲”怎么办?

济南市第一人民医院脚病治疗中心主任吴芸芸答:民间所说的“灰趾甲”,医学上称为甲癣。是由浅部霉菌感染所引起的甲板病变。多由手癣或足癣直接传播而来,但也可有单独存在者,也可因甲部外伤而感染。霉菌先从趾甲的游离缘或甲沟侵入,逐渐向甲根部蔓延。初起甲旁有发痒的感觉,多是1~2个趾甲感染,开始出现灰白色斑点,日久逐渐增厚,有的中间蛀空,或残缺不全。有的表面没有硬质层,失去了原来的光泽而变为黄色或灰色,甲内发生臭液,逐渐变为黄色粉末。“得了灰趾甲,一个传染俩”确有其因,望得甲癣的患者应尽早治疗,避免进一步传染。

治疗:可选用内服与外治两种方法。

内服:一般用斯皮仁诺胶囊200毫克,每日2次,连用一周,停三周,为一个疗程(冲击疗法)。有肝、肾病者禁用。

外治:用传统的修治方法,坚持每月一次定期治疗,每日两次外涂治甲癣药物(如:5%碘酊、环利、兰美抒、孚琪、丁克)。另有偏方:将病甲去薄后,用氯霉素眼药水滴于病甲上,每日2~3次,坚持外用,病甲有望治愈。

(彭雪征 莫鹏)

●医药信息

肝肾囊肿 脂肪瘤 甲状腺瘤 子宫瘤

哈药集团最新科研成果攻克:甲状腺瘤、结节、乳腺增生、脂肪瘤、肝、肾囊肿、子宫肌瘤等,忽视或治疗不当易癌变!西医一般手术切除,但手术对身体伤害大,易复发,往往造成不可挽回的后果。

生根源,杜绝恶变。许多服用其他药物无效或手术复发的患者,一般一周期各种肿块、瘤体变软、变小萎缩。坚持服用2-3周期,囊肿、肿块B超显示消除。许多在半信半疑中服用该药的患者无不口服心服。

专家热线:0531-66907510
销售地址:济南宏济堂药品超市
免费发货 货到付款 谨防假冒 大厂名药 值得信赖

甲沟炎 嵌甲一贴就好

嵌甲(趾甲往肉里长)、甲沟炎、手指、脚趾红肿化脓、血流不止,轻轻触碰如刀割般疼痛难忍,临床无药可医,手术拔甲又反复发作,那该怎么办?

收敛至甲床表面,甲边缘自然萌出,彻底消除嵌甲、甲沟炎。当日止痛,3-5天消肿,一般2-3个疗程治好嵌甲,反复拔甲患者需连用1-2个月恢复正常。

嵌甲、甲沟炎无痛疗法问世——“瑞杰甲沟贴”是美国百斯时历时6年独家研制的嵌甲、甲沟炎专用药,它采用美国精分子印迹分离技术,浓缩十余味原生中药强力渗透甲沟组织,深入甲床内部杀菌消炎,活血消肿,迅速软化甲刺,使深入肉中的趾甲逐渐

咨询热线:0531-89055622(买3赠1,免费送货)
经销地址:宏济堂参茸大药店(共青团路66号)、章丘永兴堂、泰安神农、临沂华康、聊城颐生堂、枣庄金星、滕州同仁、德州三易、滨州康乐、菏泽曹州、东营供销商场、潍坊华芝堂、济宁太东、青岛绿色

寻找100名脑瘫

火热进行中,仅剩13个名额

易可康葆发起“寻找100名脑瘫”活动开展后,众多家长纷纷报名。


特邀著名脑病专家鞠建英主任、徐增俊主任、吴泓主任等提供咨询,并制定囊括神经修复、专业理疗和特殊教育的脑瘫721康复方案;赠脑瘫康复光盘和权威脑健康杂志《1+1脑健康乐园》。

脑病专家徐主任强调:脑瘫根源是脑神经受损,修复神经根本物质是神经生长因子NGF和神经节苷脂GM。

国内权威医学杂志《药理学进展》指出:GM介导NGF可数十倍增强其活性,促进大脑二次发育,明显改善脑瘫儿语言、运动、智力等障碍,有效率91.7%。

据悉,脑瘫721康复方案在全国成功推广9年来,数万脑瘫儿能说话走路,甚至上学了。

活动仅剩13个名额,抓紧报名:
0531-86965398 0533-2288448
0535-7017160 0536-8855362
0537-2134689 0539-3691207
0530-6077233 0543-3689668
0546-8777750



●医讯速递

山东大学第二医院将举办女性盆底器官脱垂及尿失禁知识讲座暨义诊活动

为了提高女性生活质量,在国际三八妇女节来临之际,山东大学第二医院妇产科将于2011年3月1日-3月8日上午九点在医院门诊楼三层妇产科门诊开展大型义诊活动,为广大罹患盆底功能障碍性疾病的女性免费检查,义务宣传盆底功能障碍性疾病的自我护理和康复。活动期间免妇科门诊挂号费及诊疗费,为患者提供免费的盆底功能评估检查1次,并赠送相关健康宣教小册子。

据介绍,女性盆底功能障碍是以尿失禁、盆底器官脱垂包括子宫脱垂、阴道前壁膨出、阴道后壁膨出以及慢性盆腔疼痛等为主要病症的一类疾病,是已婚、已育妇女的常见病,发病率约为30~40%。在盆底功能障碍患者中,超过50%的患者存在不同程度的排尿异常,最典型的就是尿失禁。该病造成患者外出活动困难并引发局部感染,严重影响女性的身心健康和生活质量。

研究显示:有前科者更易自杀

英国专家最新公布的一项研究结果显示,有犯罪记录的人自杀倾向甚于普通人。

专家认为,这一研究可以提醒社会和有关机构进一步关注违法者的心理世界。

●儿科门诊

注意7个细节让儿童远离近视

注意营养 补充足够的钙、磷及维生素A、B₂、B₁、C,少吃甜食。不适当的饮食致使营养的缺乏也是导致孩子近视发生与发展的重要原因之一,补充蛋白质、钙质、磷质,应多吃胡萝卜、西红柿、豆芽、橘子、葡萄、红枣等蔬菜和水果,对预防近视有益。

注意用眼的时间 看书、写字、学习、上网或看电视40-60分钟,就要停下来闭上眼睛休息一会儿,或向远处看景物,这样能使调节视力的睫状肌得到休息,及早恢复视力疲劳。

注意眼睛保健 坚持每天做眼保健操、晶体操、自我穴位按摩,能预防近视。读书时间过长,头部不免前

倾,低头过久后,引起眼球充血,颈部肌肉紧张。阅读时双眼内聚,瞳孔缩小,晶体向前凸出,这三种反射都是产生视疲劳的重要因素。

注意用眼的姿势 读书写字时坐姿要端正,桌椅的高低要合适。有些人习惯躺着看书,有些人习惯坐在车上或边走路边看书,还有的人习惯一边吃东西一边看书,这些都是不良的用眼习惯,应该及早纠正。眼睛与书本的距离应保持在30厘米,不要忽远忽近。看电视距离不宜太近,应保持在两米左右的距离。

积极参加体育锻炼 儿童不要总是呆在室内,课间休息时可做做游戏、散散步、眺望远景等,使眼睛的

调节肌肉得到松弛,缓解视疲劳。节假日,可以到户外爬山、打打球、跑跑步、游游泳,都是缓解眼疲劳的方法。

不要在暗光或太阳光下读书写字 阴天、黄昏、月光下光线微弱,阳光下光线强烈,都不适合读书、写字。尤其夜间在室内写字或看书,台灯和台灯要一起用。

少看电视,少玩电脑 电视是一种直接光源,对眼睛的刺激作用较大。儿童看电视时间不能超过两小时,玩电脑的时间也不应超过两小时。平时要注意休息,保证充足的睡眠(每天睡眠时间应不少于10小时)。