## 降雨量偏多 种植面积减少

# 我省秋白菜减产成定局



在胶州市里岔镇良一村,村民赵世成看到白菜长了根瘤很是心疼。 本报记者 赵波 摄

**受天气影响,韩国白菜和萝卜的产量大幅减少。而我省的大白菜也因降雨量大增、种植户弃种等原因出现较大面积减产。仅青岛市白菜种植面积就减少了3万多亩。**

**本报青岛10月12日讯(记者 王倩 赵波)** 雨水增多、白菜种植面积减少,今年我省白菜的产量降低成为定局。胶州大白菜研究所有关人员预测基地内的白菜受到这些影响,最高可能减产50%。

### 菜农减种白菜 菜地兼种玉米

在青岛胶州里岔镇无公害蔬菜种植基地良一村,记者看到虽然这里作为蔬菜基地,但是地里种的却不全是蔬菜:每隔几垄白菜就是几垄玉米,有些菜地里除了白菜还有茼蒿、萝卜等其他蔬菜。“今年种植面积少了不少,你可以看到有些都种上粮食了。”青岛市里岔镇蔬菜种植专业合作社的赵义荣告诉记者,近几年白菜价格低,导致菜农种植积极性大大降低,所以种植面积减了不少。

胶州大白菜研究所的荆所长表示,不仅是种植面积的减少,今年的白菜又出现了新的病种,在他的种植基地里,很多白菜还没成熟就出现了根部变黑并烂掉的情况。荆所长告诉记者所里有两千多亩白菜,今年受这种新病害的影响,他预计要比去年减产50%左右。

### 降水量偏多 白菜易发病

按照一般规律,本地白菜是立秋时节播种,小雪之前收获,但是今年天气情况比较特殊。根据山东省气象台有关部门的统计,8月份立秋以后雨水较多,全省平均降水量为306.2毫米,比往年偏多64%。针对这种情况,山东农业大学园艺学院蔬菜系主任、教授刘世琦解释,这种症状跟今年的天气有着紧密的联系。今年立秋前后温度比较高,种下的白菜易发病毒病,表现症状为皱缩,而在后期又出现了如此多的降水,白菜就容易引发软腐病。这些都会造成大白菜的减产。

采访中,很多菜农都提到今年白菜肯定得减产。胶州市农业局农机站副站长李正家就提出,胶州总体种植面积今年减少了一万亩左右,整个青岛也减少了3万多亩,“再说还有天气等方面的原因,减产已经成定局了。”

而在聊城市大白菜种植面积达20万亩,比2009年的19.6万亩略多。但今年秋季连阴雨天气较多、光照时间不足,大白菜产量与质量却不及去年。

据了解,蔬菜批发商及种植户介绍,受天气影响,不仅我省多地的白菜出现减产,河北及东北等白菜产区,有很多白菜都烂在了地里。

**相关链接**

### 韩国泡菜危机 天气是祸首

引起韩国“泡菜危机”的主要原因是天气因素。今年韩国气候反常,春季寒冷,夏季极端高温。9月份正值白菜收获季节,又遭遇台风、强降雨等极端天气,致使白菜大幅减产。韩国往年的白菜产量为25万吨,今年的产量预计仅为15万吨,锐减了40%。韩国人每年食用大约145万吨泡菜,其中大约45万吨为工厂制作,其余的则是韩国民众或者饭馆自行制作。