记者接触自述“阴性艾滋病”者

“恐艾”说法,有人仍难认同

文/片 本报记者 郭静

近日,一种被传为“阴性艾滋病”的神秘病毒备受关注。4月5日卫生部已就此澄清,称“阴性艾滋病”只是恐艾症状。6日、7日,记者连续两天与自述“阴性艾滋病”群体接触了解到,他们中的很多人并不认同官方说法,仍然坚持认为自己身患不明病毒。我省相关专家也明确指出,“不能单纯因为症状相似而去判断疾病。”



No	项目	结果
1	免疫球蛋白G(IGG)	9.38
2	免疫球蛋白A(IGA)	722.00
3	免疫球蛋白M(IGM)	895.00
4	免疫球蛋白E(IGE)	286.92
5	抗核抗体(ANA)	—
6	抗双链DNA抗体(DNA)	—
7	抗RNP抗体(RNP)	—
8	抗SM抗体(SM)	—
9	抗SSA抗体(SSA)	—
10	抗SSB抗体(SSB)	—
11	抗SCL-70抗体(SCI)	—
12	抗Jo-1抗体(JO)	—
13	抗Rib抗体(RIB)	—

▶一份自述“阴性艾滋病”者的检查单。

自述“阴性艾滋病”者:频繁检测,都要疯了

对于林华(化名)来说,“阴性艾滋病”是个新词儿。但她对这个词儿背后包含的症状非常熟悉:乏力、盗汗、消瘦、关节疼、身体变形……

“2003年1月6日下午,我去当地一家医院抽血检查,那个护士用了没有包装袋的针筒,我当时没注意,结果12天后,我开始发烧、淋巴肿大。”4月7日下午,林华告诉记者,一个多月后,她去做了HIV抗体检测,结果是阴性的,但是她发现家人也出现了相同症状。先是爸爸频繁感冒,后来老妈也犯了咽喉炎,老公和儿子也没有逃过。

后来几乎每隔一个月她都去做一次检测,这样持续做了一年多,结果都是阴性。“我都要疯了,既然没有感染艾滋病毒,怎么老是出现这种病症呢?”

她直到现在也没有告诉家人真相,但是看到家人跟自己一样饱受病痛折磨,她愧疚得想自杀。“尤其是我的儿子,本来学习很好,但是现在常常发烧、腹泻、成绩下滑,考大学都成问题。是我害了他。”

2009年,她无意中发现了有一个名为“寻找真相”的网站。网站里面聚集了一群跟她一样有相似特征的人:他们大多有“高危”行为,最初怀疑自己感染艾滋病,于是反复做HIV抗体检测,结果都是阴性。但临床上始终找不到病毒,很多医生认为他们是精神因素导致的。

据网站管理员之一陈新(化名)介绍,目前这样的QQ群有数十个,最大的群里有上百人,“我们希望能凝聚力量,让政府给予关注,找出真相。”

官方称是“恐艾症”有人仍难认同

对于活跃于网络空间的这一群体,卫生部新闻发言人邓海华说,“阴性艾滋病”在网上已经炒了好几年了,实际上是一些人“恐艾”症状的表现。

“有些人是先有症状,然后才开始怀疑的。另外,也有一些人感染后,家人在不知情的情况下也出现了症状,这怎么解释?”陈新对“恐艾”说法并不认同。

陈新今年32岁,在2009年的一次出差中,他到街头小诊所补了一个牙,不久之后就出现了发烧、舌头发白、乏力、荨麻疹反复发作,一直到现在还在吃罗红霉素和氯雷他定。他先后做过8次HIV检测,全部是阴性。

2010年1月10日和17日,陈新所在QQ群里的59人在北京地坛医院做抽血化验。检测结果全部是阴性,得到的答复是精神因素造成的。对于这个结果,他们中有人认为“只是常规检查,没有根本意义”。他们认为要做的不是艾滋病病毒检测,而是要做病原体分离鉴定查明原因。

我省疾控专家:

恐惧心理会引发临床症状

“这绝非艾滋病毒的变种,不存在‘阴性艾滋病’之说。”山东省疾控中心副主任康殿民说,目前他们尚未接触到自述“阴性艾滋病”者。但他认为根据所公布的症状来看,很大程度上是精神因素导致的。

“实验室的检测最具说服力,阴性就是阴性,阳性就是阳性,任何专家不能单纯因为症状相似而去判断疾病的出现。”他说。他认为,这些症状跟心理原因有关。“出现这种症状后,就老是往艾滋病上靠,疑心导致恐惧心理,从而引发临床上的症状。”

实际上,他认为这些症状并不符合艾滋病的临床症状。“比如艾滋病人在一两个月内可能出现急性期的症状,之后就进入潜伏期,一般要8到10年,这期间病人没有症状表现。”康殿民说。

济南市皮防所医务科主任史克实临床上接触过不少“恐艾症”病人,但也没有接触过自述“阴性艾滋病”者。“比如消瘦、发烧、精神不振、乏力等等,有时也伴随一些部位的感染,但是在检查时又查不到病原体,这些都是主观症状。”

但他同样表示,要找到新的病毒,需要有科学依据,并且通过权威部门认定发布。

东风雪铁龙 C5 逸天地 悦人生
CRÉATIVE TECHNOLOGIE 人性科技 自由生活
CITROËN
东风雪铁龙

沪股(600051-600350)
个股简评 仅供参考
据此操作 风险自负