

【关注疫苗安全】

连续两周以来,陆续发生在湖南、广东、四川等地的多例婴幼儿接种乙肝疫苗后,出现严重不良反应的案例,引起全国广泛的关注。尽管国家卫计委等主管部门通报确认,17例死亡病例的死亡与接种深圳康泰生产的乙肝疫苗无关,安全担忧仍然存在。甚至有一些家长表示,今后将不敢轻易给孩子接种疫苗。就此,我们做了采访,竭力解答民众的普遍疑惑。



疫苗之疑

见习记者 陈晓丽

当一个儿童注射乙肝疫苗出现各种疑似不良反应后,关于疫苗的疑惑也在人们心中产生,乙肝疫苗效果到底如何?为何给新生儿接种乙肝疫苗?国产和进口疫苗有何区别?哪些孩子易现不良反应?疫苗不良反应怎么处理……

进口疫苗不良反应低 免疫效果没区别

国产乙肝疫苗属于国家规定第一类疫苗,可免费接种;进口乙

肝疫苗则属于第二类疫苗,需要自费接种,据省城多家预防接种点介绍,15周岁及以上的市民注射剂量为20微克/支,价格为120元/支,15周岁以下市民接种剂量为10微克/支,价格为110元左右/每支。

而对于到底选择进口疫苗还是国产疫苗,济南市第四人民医院儿科主任医师邢莉表示:“进口疫苗在药品提纯技术、生产工艺、有效性方面都要优于国产疫苗。因此,不良反应率相对也会低一些。不过两者免疫效果是相同的,都在3-5年之间。”同时,有接种门诊工作人员表示,由于目前选择接种进口疫苗的人较少,

难以比较两者的免疫时间长短。

轻微发热等反应 不需特殊处理

“接种疫苗后最常见的就是发烧,一般在接种后1-2天内出现,只要发热不超过38.5℃并不需要特殊处理,主要护理办法还是物理降温。”济南市中心医院儿科副主任医师彭惠告诉记者,“例如让孩子多喝水、多休息就好。”此外,减毒活疫苗类疫苗出现发热情况较晚,大约在一周左右,家长接种后应注意观察。

彭惠进一步表示,“除了发烧,一些婴幼儿可能出现肠胃不适,有腹泻的症状。”对轻微腹泻一般不需特殊处理,只要注意给孩子多补充水分,两三天就能复原。如果孩子腹泻严重,并持续3天以上都不见好转,应及时带孩子去医院就诊。

此外,专家表示,少数受种者在24小时内可能出现注射部位疼痛、红肿,一般可在2-3日内自行缓解,不需处理;接种部位可出现硬结,一般1-2个月可自行吸收。在极罕见情况下可能发生过敏反应、局部无菌性化脓等,需及时就医。

(下转A26版)